

# EFFECTIVIDAD CLÍNICA DEL CRIBADO NEONATAL DE ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TANDEM. PARTE IV.

Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG)

Deficiencia de  $\beta$ -cetotiolasa (BKT)

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Os programas de cribado neonatal teñen como obxectivo a identificación presintomática e o tratamento precoz de trastornos conxénitos tratables, para reducir a morbilidad e as posibles discapacidades asociadas a esas enfermidades. Estes programas deben garantir o acceso equitativo e universal de tódolos recém nados da poboación diana, coa correcta información ós pais para a axuda na toma de decisións.

O obxectivo de este informe é avaliar a efectividade clínica do cribado neonatal das seguintes metabolopatías: aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG) y deficiencia de  $\beta$ -cetotiolasa (BKT).

DOCUMENTOS

RELACIONADOS

Texto completo

Resumo