

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA DE ESTADIO INICIAL MEDIANTE CIRUGÍA CONSERVADORA Y BRAQUITERAPIA CON BALÓN INTRACAVITARIO.

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

A braquiterapia con balón intracavitario postulouse como unha alternativa á radioterapia externa no tratamento do cancro de mama de estadio inicial e consiste na administración de radioterapia con fraccionamiento acelerado de dose, mediante un catéter conectado a un balón. Esta técnica diminúa o volume de irradiación e permite maiores fraccións de tratamiento nun menor tempo de aplicación.

O obxectivo do presente informe é avaliar a efectividade da braquiterapia con balón intracavitario como tratamento adyuvante da cirurxia conservadora no cancro de mama de estadio inicial en termos de recurrencia, supervivencia, resultados cosméticos e de satisfacción da paciente. Determinar a seguridade do devandito procedemento en termos de toxicidade da radioterapia.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

[Texto completo](#)

[Resumo](#)

[Exportar cita](#)